eizerstraat (A-11-0171)																					
													ZEEVIS			TREK	ZOET-WATERVIS				
VOLGNR	MAASWIJDTE	HOEVEELHEID	KLASSE	SOORT	ELEMENT	L_R	AANTAL	OPMERKING			ind	gadid	gamor	clhar	anang	peflu	esluc	cypri	totaal
	in mm	in liter																	
19			pis	gamor	neu	a	1	*mesethmoideum* ; TL circa gelijk aan TL DCB 456 = 1003 mm					1						1
19			pis	gamor	pel	l	1	TL circa gelijk aan TL DCB 456 = 1003 mm					1						1
19			pis	ind			1				1								1
20	2	5	pis	cypri	fro	r	2	TL geschat: 15 cm										2	2
20	2	5	pis	cypri	fro	l	1	TL geschat: 15 cm										1	1
20	2	5	pis	cypri	ope	l	1											1	1
20	2	5	pis	cypri	sus	r	1	TL geschat: 20 cm										1	1
20	2	5	pis	cypri	lep	s	1											1	1
20	2	5	pis	cypri	vca	a	4											4	4
20	2	5	pis	peflu	par	a	1	width: 1.7 mm. TL berekend volgens DCB 1989: 99: 183 mm								1			1
20	2	5	pis	peflu	cer	l	1									1			1
20	2	5	pis	peflu	poc	?	1	*postcleithrale ventrale*								1			1
20	2	5	pis	peflu	vpc	a	3	van minimaal 2 ind.								3			3
20	2	5	pis	anang	ope	r	1	TL ongeveer als TL DCB 522 = 590 mm							1				1
20	2	5	pis	anang	vpc	a	2	van minimaal 2 ind.							2				2
20	2	5	pis	anang	vca	a	4								4				4
20	2	5	pis	clhar	vom	a	1							1					1
20	2	5	pis	clhar	neu	?	1	*proöticum*						1					1
20	2	5	pis	clhar	den	r	2							2					2
20	2	5	pis	clhar	den	l	1							1					1
20	2	5	pis	clhar	art	r	1							1					1
20	2	5	pis	clhar	art	l	1							1					1
20	2	5	pis	clhar	max	r	1							1					1
20	2	5	pis	clhar	max	l	4							4					4
20	2	5	pis	clhar	max	?	2	*supramaxillare II*						2					2
20	2	5	pis	clhar	cer	?	3							3					3
20	2	5	pis	clhar	epi	?	1							1					1
20	2	5	pis	clhar	qua	?	1							1					1
20	2	5	pis	clhar	ope	?	1							1					1
20	2	5	pis	clhar	pro	?	1							1					1
20	2	5	pis	clhar	pos	r	1							1					1
20	2	5	pis	clhar	vpc	a	11							11					11
20	2	5	pis	clhar	vca	a	15							15					15
20	2	5	pis	gamor	inr	r	1	*infraorbitale I* ; TL iets > TL DCB 456 = 1003 mm					1						1
20	2	5	pis	gamor	vca	a	1						1						1
20	2	5	pis	gamor	vca	a	4	fragmenten					4						4
20	2	5	pis	gamor	vpc	a	6	fragmenten					6						6
20	2	5	pis	ind			90				90								90
20	1	0.5	pis	cypri	vca	a	1											1	1
20	1	0.5	pis	esluc	art	r	1	*angulare* ; TL geschat: 25-30 cm									1		1
20	1	0.5	pis	peflu	sub	l	1									1			1
20	1	0.5	pis	peflu	aca	a	1	*spina pinnae dorsalis/analis*								1			1
20	1	0.5	pis	gamor	lep	s	1	*lepidotrich gepaarde vin*					1						1
20	1	0.5	pis	ind			28				28								28
68		0.5	pis	ind			1				1								1
68		1	pis	peflu	squ	s	1									1			1
68		1	pis	gadid	pte	s	1					1							1
68		1	pis	ind			2				2								2

68	2	10	pis	cypri	opi	r	1		3 tanden; lijkt op blankvoorn											1	1
68	2	10	pis	gamor	cle	r	1		twee fragmenten					1							1
68	2	10	pis	gamor	cle	l	1		twee fragmenten					1							1
68	2	10	pis	gamor	sc	l	1							1							1
68	2	10	pis	gamor	sc	?	1		*radiale*					1							1
68	2	10	pis	gamor	cor	?	1		twee passende fragmenten					1							1
68	2	10	pis	gamor	lep	s	76		*lepidotrich gepaarde vin*					76							76
68	2	10	pis	gadid	pte	s	1						1								1
68	2	10	pis	ind			22					22									22
					Totaal:		319					144	2	96	48	7	9	1	12		319
												ind	gadid	gamor	clhar	anang	peflu	esluc	cypri		totaal
De meeste visresten zijn weinig gefragmenteerd en het bot is goed tot zeer goed bewaard gebleven. In totaal zijn 320 resten verzameld. Vijfenvijfti													ZEEVIS			TREK	ZOETWATERVIS				
procent (176 stuks) kon tot op soort of familie gedetermineerd worden. Er zijn zeker zes vissoorten vertegenwoordigd. Van de zoetwatervisse																					
zijn dit een cyprinide, snoek en baars, de trekkende vissoort paling en de zeevissen haring en kabeljauw. Van laatstgenoemde soort zijn de meest																					
resten (97 stuks) verzameld. Op enkele resten na representeren deze de graten die zich bevinden in het product stokvis. De resten van de andere soorte																					
zijn van kleine individuen. De cypriniden zijn 15-20 cm, het snoekje 25-30 cm en de baarzen circa 20 cm groot. Resten van een 60 cm lange paling, maar ook																					
resten van een kleinere paling zijn aanwezig. De grootte van de haringresten duiden op normale consumptieharing. Samenvattend kan worden gezegc																					
dat het gevonden visspectrum en de lengte van de individuen zeker niet duiden op de aanwezigheid van een luxe huishouding																					